

種痘新書

痘疹新書卷之九

寧邑張 坎遜王氏編輯

受業曾衡波全泰

痘後症賦

痘結痂疔雖生意已成其八九餘毒未消而變症正慮其多端
昇以服合腹脹猶爲危候虛浮不退尙是凶機痂成成而反致
失聲前兆恐爲黑腐腫未消而眼已先開眼開疑是內攻陽氣
極而狂叫喘呼腸胃傷而嘔嘔不寧至于冷風入胃則利下膿
粘熱滲膀胱則小便溺血熱毒逗留不化痂結而壯熱增寒經
絡各道陰毒日晡而潮熱在來發在午前爲實熱煩渴腮紅中

時方作是陰虛。便調人靜。他如撮唇弄舌。心經熱盛。何疑扶肘。抬胸。肺胃毒冲。有準。身熱燉人。而便秘。恐來暴瀉。風攸攸潮。熱兼泄瀉。久變慢脾。風症驗。喪目于眼合羞明。辨口疳于唇焦。齒黑塞熱。下注大腸。必有秘結之禍。虛寒客留臟腑。乃成泄瀉。之疴喘渴。須分虛實。驗症切勿差訛。欲觀痼落之餘。再將癰疽之色。桃紅潤澤。榮衛俱安。紫黑乾枯。尚留風熱。粉白為氣血之虛過也。應深逝走馬狀牙疳之烈。月餘亦見長點。遍體赤瘡。乃是失於解利。渾身青紫。恐為風寒所吹。餘毒未清。不特為疽。為癰。見風太早。恐其復發。瘡痍此是先賢之秘訣。余向後學以

實傳。

痘後調治法

痘至十五六日。膿齊其功已就。至是雖可無虞。第恐癰潰。癰潰。致留餘毒。爲殃。餘毒若在肌膚。是必爲疽。爲癰。疽癰既形。則勇不內攻。此兒知其不爽。雖綿延亦可全生。若熱蘊肝經。則目紅頭痛。而眼合。若明肺留餘熱。則咳逆痰涎。而瘡痕外著。實熱下注大腸。則大便或來膿血。裏急後重。致生痢病。之病餘熱若滲勝。其必陰囊腫脹。以致小便赤痛。若夫日瘡腐爛。齒血牙疳。狐惑瘡生。皆是胃經有毒。至若驚搐狂言昏沉。瞤瞤弄舌。搦辱。悉是心家之熱。經絡若留餘毒。是以變生。莫測。總隨症以調治。有熱則退其熱。有風則去其風。勿謂痘家之症。遂膠固而不通。

但用藥不宜太猛。恐元氣難任。寒涼良以大病之後。氣血已耗。不惟病者必須慎其藥餌。卽未病者亦宜謹其起居。蓋洗浴太早。恐生浮腫。冒犯風寒。致生潮熱。悞服食物。致腹脹痛。痘痕損破。乃病瘡。瘡是以落痂之餘。最要避風寒。節飲食。莫速梳頭。莫早洗浴。不可出外行動。不可忍飢過食。熱物慎勿多食。生冷切須禁忌。必待氣回血復。精神如故。臟腑安寧。然後可以無虞。痘收結痂厚。遲之三日。自落者吉。又痂色光潤。其藏帶紅。更無他症。飲食如常者吉。自食痘痂。雖有他症。任由不食。

痘後雜症

癰癤

痘後發熱症有數端。有氣血回元而熱者。則悠悠潮熱。不渴。不一二日。氣還血復。而熱自退矣。不必服藥。又有痘後正。虧或久坐。久視。勞動傷神。而發熱者。只須安息調養。不必服藥。又有感冒風寒。而發熱者。必聲重鼻壅。惡寒惡風。宜用補中。益氣湯。人參。黃芪。白朮。茯苓。升麻。柴胡。炙草。熱甚。則以升柴為君。加前胡。有咳嗽。加陳皮。桔梗。半夏。南星。炒。外不過一二服。其熱自退。又有餘毒攻作。將發癰疽。而潮熱者。必痘漿清。痂漸然而煩渴。舌有黃苔。遍身俱熱。有一二處尤熱者。即瘡之所在也。治此宜解餘毒。精神旺者用連翹。飲。

連翹

牛子

柴胡

前胡

當歸

赤芍

防風

荆芥

木通 車前 炒芩 炒連 中退 活石 甘草 弱者加

人參 黃芪 大便秘者加酒大黃 或頭目大痛者餘毒上

攻日疾將作也仍以連喬飲去木通車前活石加升麻桔梗川

芎薄荷白芷蒙花菊花 目紅去當歸加胆草紅花生地 俱

必熱退痛止藥方可止然痘後元氣已虛解毒之藥必傷元氣

若毒清熱退即宜溫補以顧元神 又有氣血兩虛而熱者其

熱稍緩頭熱面不甚熱手足心熱手足背不熱精神怠倦大小

便利者乃虛熱也其熱多在午後故曰發在午前為實熱申時

方作是陰虛治此宜用十全大補湯 又有餘毒不形痘痛而

特傳于肝肺而發熱者晝夜不息舌有黃苔或十指攣縮用生

地 柴胡 白芍 炒茶 姜虫 勾藤 牛子 知母 升
皮 澤瀉 花粉 枣皮 甘草 此必血燥皮紅

〔痂落不落〕

痂黑唇紅而舌有苔其身有熱者此餘熱爲歿而不落也宜用
調元化毒湯與服解其餘熱外用細茶猪膏共搗以絹盛之卽
于痂上茶以解其熱膏以潤其燥其痂自落矣 若痂薄唇白
而舌無苔者此元虛而血不潤故不落也宜用人參 黃芪

當歸 炙草 虫退與服外用雞膏與茶潤之而自落也 又

有痘痂不落虛弱之甚昏沉不省人事者用人參清補湯 人

參 黃芪 當歸 白朮 扶神 枣仁 麥冬 陳皮 甘

卓 又有痂乾陷入肌肉而不落者用乳香 二錢 輕粉 二錢 共

爲末用猪膏調敷 又或用鷹糞燒灰馬齒草汁和蜜調敷

又或過服辛熱而痂不落者用升麻 乾葛 防風 連翹

虫退以去肌熱而自落矣

痘後發痒 抓破成瘡

此皆血熱之症宜用黃芩 黃柏 生紫草 甘草 生牛子 銀

花 生地 紅花共煎油搽之即愈

痘爛復墮 致成瘡疥

亦用前方與搽或用黃豆燒灰調油搽之亦可

癰白

此因癢清而血不足也宜用四物湯加白朮 陳皮 紅花

唇不蓋齒

此氣血兩虛而毒留脾胃也失治將變走馬牙疳宜用人參

當歸 赤芍 元支 牛子 蓮荷 石羔 石斛 甘草

玄參

並立戰搖

此氣血虛也宜用八珍湯

飲食倍進

若面赤喘急二便秘澀則內熱易于消燥也若不急治必生他
症且以四順飲主之 大黃 醋制 當歸 芍藥 甘草

痘後諸瘡

遍身枝節上生瘡者名爲疳蝕。此因風寒相搏而氣血滯凝于
腠理而乃生是瘡也。宜以前綿鹽散敷之自愈。又有見風太
早致成癰癰而出膿汁者。燒乾牛糞敷之。又有痘風瘡者。年
年至春卽發。宜用防風 荆芥 牛子 甘草 苦參 當歸
又或用 當歸 連翹 牛子 防風 荆芥 生地 赤
芍 紫草 甘草 蒼朮 川芎 薄荷與服。外用黃丹 黃
柏 黃芩 大黃 輕粉共爲末以猪油調敷。再于風池曲
池三厘諸穴以火灸之則永不發矣。又有皮膚之間隱隱而
起者俗呼疙瘡。此皆餘毒滯于皮膚而然也。宜服解毒藥外敷

漆根剖開取其腹內之水洗之或用蜆壳煎水亦可蜆形如蚌壳生魚池泥中凡割漆者必用此壳俗呼漆規其性涼而解毒又有用活石一兩甘草五錢共爲末調敷瘡上者名天水散凡痘痂之後抓破出血遍身復灌膿漿成血風瘡勢至春夏南風一起其瘡復發秋冬自愈但不纏染他人者俗呼痘風瘡也欲其不發須用火炙風池曲池三里諸穴內用苦參丸或花蛇酒與服則永不發矣

又方一掃光治一切瘡疥 銅綠 白礬生 大黃 樟腦 流黃 川椒 膽礬 梣子多 白芷 水銀 錫 右方各等分爲末另將錫融化入水銀攪勻然後入諸藥末調猪油敷上

苦參丸

苦參 炒枝 防風 只壳 玄參 獨活 黃連 黃芩

大黃 菊花 等分 共爲細末蜜調作丸如梧子大每服五寸

丸 酒送下

花蛇酒 川白花蛇一條蒸米數升先放酒曲次將布袋盛蛇

貯于酒曲之上然後將蒸米與酒藥和均頓于蛇上用帛封缸

口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨每服酒時配蛇全服再將

酒調苦參末爲丸服 愚謂只將蛇去其首置酒甕中入好

酒封固其口謾火煮熱俟數日取酒與蛇並服

癰癤

瀉朱苓 活石 甘草與服外用川三漆磨好京墨塗之先用瓦鋒刺去毒血後用墨與三七塗之即愈

走馬牙疳

其先牙齦生痒時時出血繼而齦黑腐爛其齒漸落或每日落一齒或一日旋落數齒滿口齒俱落盡乃死見齒生痒即宜施治此蓋胃經蓄熱所致宜用人參石燕牛子甘草石斛與服以解脾胃之毒再用石羔牛子連齋黃芩生地紫草蛇床枯礬甘草煎水與嚼即愈若牙齦腐爛則用蚕退散敷之 枯礬三錢人中白即尿尿焙乾二錢 五位子二錢 蚕退燒一錢 蛇床子二錢 共為末先用蠟蠟虫蘸米泔水洗淨腐肉惡血然後以末敷之

之。又救苦散亦治牙疳。人中白、煅青黛五分、冰片一分、白
蠶虫半錢、寒水石三錢共為末敷之。又用蠶虫、丹皮、甘草心
連、荷心、生地、銀花、桑白皮、沙參、茯苓、炒柏等分煎服。虛弱者加
人參。

唇口生瘡

上唇有瘡，虫食其臟，其名曰狐。下唇有瘡，虫食其肚，其名曰惑。
皆由裏熱生虫，可食臟腑以及干肛而外于唇之上下，乃有瘡
形也。必其人昏昏好睡，不思飲食，其聲啞啞而音不亮，即狐惑
也。此最惡之候，必致鼻崩齒落，失聲而死。宜用除惡丸治之。

黃連二錢、廬薈一錢、使君子肉三錢、白蕪荑一錢、乾蟬三分、煅灰川

種痘新書 卷之九 痘後雜症

練子肉 一錢 共爲末用烏梅洗淨去核搗爛和末爲丸米飲下
又有口舌生瘡赤者名赤口瘡此心脾蓄熱也白者名白口
瘡此心肺有熱也赤者用陰陽散白者用朱礬散 又通用洗
心散與服 又通名爲口瘡以鷺涎洗淨卽鷺毛煎水洗之亦
可必洗淨乃可敷藥亦有洗之卽愈者 又用古脾車蘸米泔
水洗之者

陰陽散 黃連 三錢 乾薑 一錢 共爲末敷之

朱礬散 硃砂 二錢 白枯礬 一錢 共爲末敷之

洗心散 黃連 歸尾 生地 木通 薄荷 牛子 連翹

桔梗 甘草 煎服燈心湯引

緣和散

黃芩

黃連

石羔

寒水石

各二錢半 明砂一錢

五分

青黛

共為末凡爛口瘡敷之立效

耳病

有痘後耳內腫痛流膿出血者俗名蚕耳須先用棉花攪淨洗
血然後用黑砂糖調水少許滴入耳內其痛立止而汁自乾戒
勿抓把而自愈矣

腹痛

有口禁強直冷汗如雨通臍而痛痛定汗止者防風寒八胃俗
謂盤腸內釣也用升消平胃散加勾藤水香一服立平
有痛而吐瀉交作者用正氣散藿香 陳皮 半夏 紫蘇

大腹皮 厚朴 茯苓 木香 白芷 山查 神曲 炙草

白芍 有大便秘結而痛者用白芍 二錢 厚朴 一錢 陳皮 七分

甘草 三分 大黃 一錢 有方醫之後忽然腹脹而痛煩悶不寧者

必漿清瀉薄餘毒入裏最為危急未幾漸加喘急手足厥冷則

不治矣速用 雄黃解毒丸 雄黃 一錢 益金 三錢 巴霜 三錢

兵為米米糊為丸如米粒大好酒送下 有腹中飽脹不思飲

食時時而作痛者此必誤服食物或過服熱藥而致餘熱滯積

而作痛也其必腹有微熱治宜消導解毒為主用蒼朮 厚朴

陳皮 半夏 木香 香附 砂仁 牛子 連翹 山查

神曲 川芎 前胡 炙草與服

不食

痘後臟腑空虛。最要能食。方可滋養百骸。以復元氣。若其不食。不亦危乎。然有脾胃虛寒而不欲食者。必唇舌俱白。而身復涼。精神困倦。頰向人言。須用人參、黃芪、當歸、川芎、白朮、茯苓、丁香、肉桂、砂仁、乾姜、山楂、麥芽。又有脾胃滯留餘熱而不欲食者。必舌心有苔。腹脹微熱。仍用前消導解毒之方為主。又有一向能食。忽然聞食則嘔而不欲食者。必爲傷食所致。若不施治。必成疳勞。須用平胃散加三稜、莪朮、只實、良姜。問其所食何物。即將原物爲引。

心痛

必鬱熱蓄于心胸。故在臍以上痛。須用鬱金。陳皮。半夏。
桔梗。黃連。山枝。炒。玉竹。水香。香附。厚朴。白芷。
逆喬心。

虫痛

腹痛時。腹中滾起數團。痛定而塊亦落者。此是蛔虫過多。所食
又少。穀氣不能養蛔。或胃有滯積。而蛔不安。故蛔虫在內攪亂。
滾起而作痛也。宜用平胃散。加使君子肉。苦練皮。胡黃連。
服後。瀉出蛔虫。則永不痛矣。

手足厥冷

五。脈沉細者。元氣虛也。宜以調元生脈湯。生之。

人參 炙草 炙芪 當歸 門冬 官桂 其加附子

昏迷錯語

當毒氣已散元氣未復精神疲倦故昏昏喜睡即呼之不醒亦
自無妨若連日不醒日中喃喃自言自語形如醉人每多交語
者此邪熱乘于心胞也宜以導赤解毒湯或安神丸主之

導赤解毒湯

木通 車前 生地 門冬 甘草 茯神 石菖蒲 枝子
人參 燈心湯引

安神丸

牛黃 五分 黃連 五錢 當歸 二錢 五分炒枝 二錢 共為末 八猪心血和

痘後續施

白爲九硃砂爲衣燈心湯下卽若無真牛黃則加川以煎星

琥珀

驚搐危

此必毒化未盡火毒攻心所致也此時血氣已衰正不勝邪故
曰痘後發搐是凶機然搐而易退者正氣猶足敵邪尚可以治
若連綿不已則必死矣宜用清神散火湯或粉紅丸治之

清神散火湯

木通 車前 麥冬 玄參 黃連 甘草 枝子 燈心湯

引加神砂調服 大便叔者加酒大黃 弱者加人參

粉紅丸

胆星 天竺黃 神砂 胭脂米 各三錢 共為末作先生膏用
荷湯下

咳嗽

此餘毒流八于肺肺熱生痰故咳嗽也只宜清金降火為主但
久而不止胸高肩息者則不治矣凡嗽用寧肺散 知母 牛

子 桔梗 陳皮 馬兜鈴 杏仁 金地 川貝 桑皮

吉紅 炒芩 甘草 又有元氣虛弱而風邪入肺而咳嗽者

必有寒乍熱宜用補中益氣湯加桔梗 陳皮 半夏 白附

蒼仁 又有潮熱不息肝肺二經皆有風熱而咳嗽者宜用柴

胡 赤芍 炒芩 炒枝 胡黃連 全蝎 勾藤 川貝

花粉 桔梗 陳皮

尿血

此熱滲於膀胱也。其必小便短澀而痛宜用。午子 銀花
木通 車前 瞿麥 滑石 赤苓 朱苓 澤瀉 又方用
苦練樹皮入猪尿胞內煮熟與服立效。然必先服前方數劑後
以此而收功也。

秘結

痘之首尾俱要便調。若便秘恐留餘毒。如無他症則必候服
熱以致陰血受虧不能滋潤。宜用潤腸湯主之。歸稍 生地
麻仁 桃仁 甘草 有熱加知母 石膏

痘前。要。腠。理。開。通。而。毒。乃。不。閉。故。宜。有。汗。痘。後。要。腠。理。緊。秘。而。風。邪。方。不。易。侵。故。不。宜。過。汗。然。動。作。用。力。或。飲。食。溫。充。氣。血。動。暢。身。軀。溫。煖。而。出。汗。者。常。也。若。身。不。舉。動。而。飲。食。未。進。其。汗。自。流。者。謂。之。自。汗。寤。寐。之。中。汗。濕。衣。席。醒。則。自。止。者。謂。之。盜。汗。盜。汗。自。汗。皆。由。表。虛。所。致。宜。用。人。參。炙。芪。炙。草。當。歸。炒。連。桂。枝。與。服。其。汗。自。止。又。方。用。當。歸。炙。芪。炙。草。生。地。麥。冬。炒。連。麥。麩。八。猪。心。內。煎。熟。與。服。

諸失血

鼻。衄。血。者。熱。流。于。肺。也。目。吐。血。者。熱。蘊。于。胃。也。小。便。血。者。熱。注。

于小腸大便血者熱滯于大腸皆由熱留于裏致血而妄行也
急用涼血地黃湯主之治之而血止則生不止則死

涼血地黃湯

黃連 歸尾 生地 炒枝 玄參 甘草 犀角 衄血加
黃芩 茅花 吐血加知母 石羔 童便 香附 小便血加
木通 活石 車前 大便血加秦花 槐花 地榆 諸血
不止槩加蒲黃 藕節 掌柄

蛔

蛔虫從口鼻而出者皆由裏熱蛔不能安故從口鼻而出也但
熱毒上蒸則蛔從上出熱從下迫則蛔從下出其症皆凶

黃連止痢湯治之 黃連 黃柏 炒烏梅 人參 白朮

引一痢痢

欲便難便裏急後重或赤或白或紅之腹痛是痢痢也此皆熱毒
鬱于腸胃是故有是症也但赤屬血自小腸來白屬氣自大腸
來赤者以活血爲主用四物湯加炒芩炒連木通甘草桃仁紅
花久而不愈則去桃仁加阿膠硃砂炭姜白者以扶氣爲主
用四君子湯加炒芩炒連木香炒活石陳皮裏急
後重加貝壳生白芍腹痛則多放木香肛門突出則加
升麻以提氣土行久而不愈則加黃芪乾薑砂仁若赤
白並下則以四物四君子合飲而加炒連若小便赤澀而煩

渴者加生地 木通 車前 麥冬

東垣曰痘症下痢須用升麻提起正氣使痘不致下陷。可見痘中治痢須用保元湯加升麻為主。然後隨其赤白加減治之。在痘中不致陷伏之虞。痘後可免喪元之禍也。

傾下膿血

古名倒靨。但毒從傾解。不可妄治。若驟止之。則閉門留毒。其禍不旋踵而至矣。若傾不順利。而後重者。須用黃連解毒湯。黃連 黃芩 俱炒 只壳 歸尾 紅花 酒大黃 甘草 又或用和中湯 人參 當歸 只壳 陳皮 木通 甘草 若素有積熱。腸鳴復痛。裏急後重者。宜先用調胃承氣湯以瀉

其藥以芩連湯成香連丸治之

調胃承氣湯

厚

大黃

酒制

枳實

甘草

蜜炙

芩連湯

芩連

俱酒炒

當歸

川芎

甘草

木香

赤芍

久下加升麻

香連丸

川連

兩葉黃水制炒

木香

二錢 共為末醋糊為丸如麻子大

水飲下

若久而不止與痘中下膿血者用韭葉白 豆豉 炒板仁 久痢脾虛則用人參 白朮 茯苓 官桂 川芎 當歸

赤芍 升麻

痘後浮腫

痘後膿血去盡脾土已虧氣血俱衰邪易入而食易傷故或感風濕或傷飲食或滯餘毒皆發爲浮腫然感冒風寒者多自面自先腫而身熱口渴宜用升麻柴胡茯苓木通車前防風付皮甘草薑蔥引令出微汗而腫自退矣有感濕氣而腫者多在足下先腫其形光亮以手按之而卽有窩其起亦緩且其人好飲而小便赤澀以水洗之而愈腫者水腫也甲當健脾利水爲主宜用蒼朮厚朴木通車前活石瞿麥澤瀉朱苓茯苓皮大付皮使小便清利其腫自消外用蒼朮檀香燒烟熏之以被縗蓋冷出膿

水其腫即退

又有食積而兼滯毒者。多自腹先腫起。必腹中隱隱作痛。不想飲食。且腹有微熱。大便黃臭。小便赤澀者。滯積而腫也。治當消導解毒為主。宜用蒼朮、厚朴、陳皮、枳皮、香附、川芎、山楂、神曲、牛蒡、連翹、木通、車前、茯苓、皮、陳皮、半夏、甘草。

又有脾氣不行而浮腫者。其皮如鼓。按之難下。乃氣腫也。治當理氣為主。宜用人參、五皮散治之。人參、白朮、官桂、麥冬、大付皮、陳皮、桑皮、姜皮、茯苓皮、木香。

澤瀉、車前、木香

又有血不行而腫者其皮膚之內隱隱若有血路是血腫也治當以活血爲主用四物湯加入參 陳皮 香附 木通 茯苓治之使血行而腫自退矣

又曰面目四肢腫者屬肺因表虛爲風寒所侵而腫宜發活而腫自消用加味五皮散主之 羌活 防風 桂枝 防己 蒼朮 木通 五加皮 桑白皮 大付皮 茯苓皮 姜皮 朱苓 甘草

又曰腹脹加鼓脹胞微腫者屬脾胃脾胃素虛土弱不能制水以致水蓄而不行故浮腫也 又或傷食滯積脾不能消以致濕熱內蓄而腫者俱以厚朴湯治之 蒼朮 厚朴 陳

皮 大付皮 茯苓皮 朱苓 木香 水腫者其陰囊亦

腫加 澤瀉 活石 車前 水通 葶藶子治之 積滯

腫者加 山查 神曲 三稜 莢木 又萊服此通治一

切浮腫 萊服子炒五錢 胡椒 厚朴五錢 白木二兩 共為末

作丸以陳皮煎湯送下

又虛弱而氣不行者用肉桂磨酒服外用燒酒擦之即愈

餘毒疔癰

凡痘漿清而薄者必有餘毒收結之餘其毒多發于手足腕中
接骨之處紅腫潮熱為痘為癰俱發于手足四肢者生若發於
心胸腹上及顙門耳下者而餘痘既現癰疽則不內攻有生理

矣。然此等之毒，由于骨髓，必綿延難愈。若或失治，則并解腐骨，致風廢拘攣，以貽終身之疾，是豈尋常疽癰而已哉？方其始發，必然潮熱，宜速用連喬飲，或仙方活命飲，或十三味敗毒散，以退其熱而解其毒。

連喬飲

連喬 牛子 防風 荆芥 炒芩 炒枝 山退 赤芍
當歸 柴胡 木通 車前 活石 甘草 弱者加人參生芪

仙方活命湯

白芷 防風 乳香 沒藥 連喬 川甲 赤芍 當歸 稍
貝母 花粉 全銀花 皂角刺 陳皮 疽形既現須用此

右方排膿解毒止痛消癰無膿者可使成膿有膿者能令其

膿消腫十三味散不過顛倒而異其名也。

紅腫者用活血解毒湯防風荆芥生地赤芍當歸連翹牛子黃連紫草川弓木通甘草曰正弱者加參芪。

腫者用消毒湯防風荆芥牛子首烏甘草痛加乳香沒藥白

芷腫毒在上用升麻毒在下用牛夕引在手用桂枝引

凡痘後之人元氣必弱雖解餘毒亦當顧其元氣以上諸方但

宜加參芪蓋痘發餘毒不致內攻未必死人性命若欲求速

效。妓用清解之劑恐元氣一耗禍起蕭牆是不死之症而反

立致其死也不堪志乎余見世之庸醫遇痘後潮熱餘毒發

孫恆據聶公之書。輒投大連喬飲。以致變生。莫測。令人不可
救者。不可屈指而數也。故余治餘毒。必先調元。以顧其本。而
兼解毒。以治其標。標本兼治。十無一危。且須內外交攻。毒始
易去。看其腫便之最起者。是潰膿之所也。宜用瓦鋒刺去惡
血。然後用藥。從四圍敷之。留口莫敷。令出毒氣。將四圍之毒
趕聚一圍。再用膏藥貼之。拔盡膿汁。而自愈矣。若已成膿。亦
以針刺之。令膿潰而痛立除。亦以膏藥收功。

敷藥方列後

一方三豆散 綠豆 赤小豆 黑豆 共爲末調醋敷之
一方用豆心渣敷之

一方鐵箱板。取樹上白屈虫。新瓦焙成灰。爲末。調油。敷之。任諸癰毒。俱可內消。其疳腹下盡皆生足。其背壳硬跳下地來。即自尾交合。其形如環。其大如指。長二寸許。

一方芙蓉膏。芙蓉花或葉或皮或根俱可。惟花更佳。黃荆子各等分。共搗爛。用鷄蛋白調敷。留頂真敷。連敷二三次。即頂如烟起。立時止痛。其效如神。

一方必勝膏。馬齒莧。搗汁。猪膏脂。石蜜。共熬膏敷之。即消。

一方用紫花地丁。搗酒與服。搗爛外敷。任無名腫毒。無有不退。

一方用黃豆。薑葱。共搗敷之。亦消。

一方如意散 生南星 八錢 生半夏 一兩 鬱金 五錢 生大黃 兩

薑黃 五錢 白芷 五錢 蒼朮 五錢 共為末用醋調敷

一方沖和膏 紫荊皮 兩 獨活 兩 赤芍 兩 白芷 二兩 石

葛蒲 一兩 共為末酒調敷 內服六君子湯加北芥子

此餘毒不甚起頂且不紅者多是元虧不能升毒必用內托散

與服然後其腫乃聚其頂乃起頂起腫聚方可成膿而愈也

一毒瘡已潰不能收口者須用生肌散 黃連 黃柏 地黃

皮 梔子 桔槔 甘草 共為末以摻之

一膏藥方 防風 商陸 連翹 生栢 生苓 花粉 苦

參 赤芍 羌活 獨活 川烏 木瓜 麻黃 首烏

星刺 南星生 半夏生 白及 川甲 草烏 木鱉 紫堇

紅花 蛇退 大戟各一兩 用桐油三斤將諸藥入油內生浸

一宿然後熬煎見藥查枯浮乃用棕柞去其查再將 乳香

沒藥去油 石脂 銀硃各三錢 血竭 兒茶 輕粉各三錢 龍骨

水粉各一兩 黃丹十二兩 共為細末着油滴水成珠漸漸入此

藥末攪勻

痘疔遺爛成坑或疽潰不能收結者宜服人參敗毒散加川

山甲 正退 薑炭 連翹 皂角 小月各一錢 雄黃一錢

吁二錢 輕粉一錢 陀參二錢 黃丹炒八分 血茆五錢 黃柏生二錢

乳香 沒藥五分 杭粉一錢 血竭一錢 冰片一分 共為大散

之其口自合

兒。痲。落。發。熱。手。足。腫。隨。者。用。大。連。翳。飲。與。服。外。用。三。豆。豉。豉。之。忽。然。變。症。狀。同。急。驚。延。余。往。視。余。觀。其。左。耳。以。及。左。額。俱。紫。黑。其。紅。腫。亦。在。左。邊。手。足。啼。叫。不。寧。但。唇。舌。俱。白。余。謂。此。兒。元。氣。已。虧。不。能。勝。其。餘。毒。又。復。內。外。俱。受。清。涼。之。藥。餘。毒。將。八。臟。腑。毒。盛。生。風。而。肝。症。居。多。肝。以。藏。血。肝。經。血。少。毒。將。乘。之。故。左。額。青。紫。肝。動。生。風。故。狀。同。急。驚。也。宜。大。補。血。氣。兼。驅。風。散。毒。爲。主。遂。用。人。參。黃。芪。當。歸。白。芍。鹿。茸。天。麻。白。附。薑。虫。牛。子。防。風。白。芷。炙。草。一。服。而。面。頰。青。紫。之。色。已。退。乃。去。天。麻。白。附。薑。虫。純。用。

之劑而兼解毒之藥乃漸漸聚腫起頭出膿而愈可見清熱解毒之藥痘後元虧莫輕試也

一兒痘後兩手腕間腫脹不能轉曲已經八月有餘延余往視余見其氣血已衰以瓦鋒刺之並無血出亦不知痛余謂宜活血解毒遂用黃芪 當歸 川芎 白芍 防風 白芷 肉桂 元枝 連喬 牛子 金銀花 皂刺 桂枝 碎補 勾藤 炙草 煎酒與服 外用生南星磨醋與敷過數日犯處生痒刺之有血矣後將前方爲末一斤每日三服調酒與服其腫漸消而愈

鼻淵

痘後鼻中時時流涕臭不堪聞者名鼻淵也。此熱毒乘乎肺經而熱蒸肺竅而然也。宜用絲瓜近蒂五寸加黃芩、枝仁、牛子、甘草全煎服。外用絲瓜藤燒灰爲末吹入鼻竅。又卽以絲瓜灰調酒服不過數日鼻氣自息而涕亦止。

眼目

目爲五臟精華之聚。最是輕清不容塵染。毒氣稍侵多致喪明。可不慎乎。故痘發之時恐痘入眼。先以油胭脂塗其眼眶。或以牛旁爲末。蜜調敷其四傍。或以白芥子爲末水調敷其足處。引熱下行。俱防痘毒入眼之良方也。然或漿清痂薄餘毒上攻。手目是故有紅腫而不能開者。宜用。

洗肝散

川芎

歸尾

羌活

防風

薄荷

枝子

赤芍

紅花

菊花

胆草

甘草

飯後服

眼痛加蔓荊子

蔓荊子

蔓荊子

石羔

谷精草

萊豆

有翳膜加

山退

白蒺藜

白蒺藜

白蒺藜

賊

石決明

蒙花

大便秘結者加

大黃

黃連

牛子

牛子

小便短赤者加

車前

木通

活石引火下瀉而止

焦之火

乃清

紅赤者血熱上犯

干目也加生地

有翳膜者用撥雲散

防風

羌活

黃芩

黃連

白芷

白芷

白芷

甘菊

荆芥

龍胆草

石決明

草決明

石羔

七厘

七厘

又方除翳膜用蒙花散

蒙花

石決明

七厘

木賊

羌活

羌活

羌活

活為米清茶調服

活為米清茶調服

活為米清茶調服

活為米清茶調服

活為米清茶調服

活為米清茶調服

活為米清茶調服

活為米清茶調服

羌菊散

治眼今羞明

羌活

菊花

胆草

谷精

京芥

薄荷

蔓京

枝子

連翹

赤芍

生地

黃芩

黃連

有翳加七厘

決明

胆草散

治羞明障翳

胆草

甘菊

七厘

白芷

防風

黃連

虫退

木賊

枝子

鬼糞散

治痘毒入眼生翳

鬼糞炒黃色爲末

又用虫退

木通

甘草煎水調服

鬼糞丸

治痘毒入目生障翳

鬼糞炒四

石決明

七孔者

草決明各一

白芍

一兩

當歸

防風

谷精錢 蒺藜各五錢 薄荷四錢 共為丸如菜豆大每服數丸

用別芥煎湯送下

涼肝明目散 治痘後羞明

當歸 胆草酒洗 蒙花 柴胡 川芎 防風 川連 和猪

肝全煎服

望月散 治痘後兩目難開

望月砂即屯尿一兩 蒙花 虫退去足 谷精各五錢 共為末用猪肝切

開每肝一兩入末一錢包于肝內煮熟連肝及汁俱服

眼有白翳或赤者用藥點入諸方列後

一方用青檀核磨清水點入可除白翳

一方用小魚子將魚頭在翳上蘸洗亦能洗去其膜

一方用黃蟾血磨牙箸點入亦可去翳

一方用桑樹內細嫩皮并水浸爛爲丸磨清水點入立效

一方用胭脂或胭脂米點入或紅或膜皆可以除此解毒涼血乃良方也

一方用水牛身上所生蟹子以其血澆入卽效

一方用輕粉黃丹雄黃射香共爲末左眼有翳點

入右耳右眼有翳吹入左耳其翳自除

一方用木鱉一個爲末取雞子開一小孔入末在內蒸熟與服亦能除其翳膜

一、方取白雞拔其翅毛以肉中拔出之。並潤滑而軟。向眼中。上揩抹其翳可去。

以土諸方俱各有效。故悉錄之以備參用。

天地陰陽之精。則畢聚于日月。人生五臟之英。而悉粹于雙眸。故瞳仁屬腎。烏珠屬肝。眼白屬肺。眼角屬心。上下眼胞則屬脾。胃。凡目無障翳。而瞳子昏沉。珠無精彩。此其腎源將竭。英華已衰。宜以鬼絲。枸杞。覆盆。元支。滋腎以養其元。而清涼吃而不用。其如上下胞筋。則脾胃已敗。其人必多泄瀉。宜以白米。茯苓。淮山。丁蔻。要在健脾為主。至若紅腫。必是血熱。羞明。必是火炎。血熱。火炎之症。須清上焦之熱。而腫頭頂之風。且涼諸經之血。其

症乃可消除。然火勢上炎，必須下瀉。故大黃、枝子是抽薪之妙。用車前木通爲止沸之良方。要知目爲肝竅，凡目疾之作，總不外乎平肝。而痘後之症，斷是毒犯精華，紅腫頭疼，乃熱毒之攻。擊急宜涼血清肝。雖不紅腫而羞明亦是英華留蓄，餘熱若無紅腫羞明之弊，眼內忽生白翳，則用前方點入翳膜亦可消除。須戒服熱物，恐助熱毒爲殃。若或見風太早，風侵淚下，汪洋上下四弦紅赤，眼目自覺生痒，此是風眸之症。年年復發爲殃，余恆屢臨此症，因而制就其方。

祛風明目散 治痘後風眼，凡弦紅作痒，下淚者百無不效。

防風 荆芥 川芎 薄荷 生地 紅花 連翹 白芍

菊花 蒙花 谷精 覆盆 曼荆 川椒 生薑 附子 藜蘆
服數劑可以除根

痘後逆症

一 痂落而癰雪白者。氣血盡虧也。急用十全大補湯以補其氣。血養其脾胃。不然必飲食漸減。肌膚消瘦而死。

一 痘後發搐連綿不已者。心氣已終絕。神無所依也。不治。

一 面色青白。神氣昏暗。目無神光。瞳子不明。心腹疼痛者。不治。

一 眼睛吊白。失智亡魂。不省人事者。不治。

一 寒戰咬牙。手搖足搐。禁口不開者。不治。

一 目閉腹脹足冷過膝者死。

- 一 牙齦腐黑臭不可聞者其胃已爛也不治
- 一 遍身腫脹者湧入于脾不能制水也不治
- 一 抓破穿肌遍身肉爛者不治
- 一 口鼻出蛔滾滾而上者胃絕也不治
- 一 遍身大熱忽一日之內其痂盡落即發驚搐者身入攻心也不治
- 一 潮熱不退肌膚盡落其瘦如柴者不治

種痘新書卷之十

望邑張 琰遜王氏編輯

受業曾衡波仝參

女子出痘

痘瘡以氣為主。以血爲附。氣血充足。乃可灌汁成膿。女子若至十四天。癸巳動。倘遇出痘。而經水忽行。則陰血已虧。將何以運毒而成漿。雖然發熱之初。經期適至。則毒隨血解。可以無慮。若至三日之後。而血猶不止者。則熱入血室。血至妄行。此內動也。虛之遠治之。不容緩也。否則血虛不能送毒。狂亂忽生。須臾而告變矣。故經行二日急以四灰散調酒與服止之。若至五日血

猶不止急以涼血地黃湯治之

灰散

舊棕 老杉樹皮 胎髮 臍帶 俱燒灰存性調酒服

涼血地黃湯

當歸 川芎 白芍 生地 白朮 升麻 川連 甘草
人參 枝子 玄參 阿膠

右方加棗二枚水煎服以痘出血止為度

一女子非經行之期於發熱時而經水忽至者乃火毒內熾血妄行也其毒必盛其血必多急用涼血解毒湯倍加連翹生旁或用柳花散治之若因循隱忍則血愈虛而毒愈熾

旋踵而伏。陷內攻。雖有良醫。亦難治其後矣。

涼血解毒湯

當歸二錢 白芷七分 升麻五分 紅花二錢 紫草一錢 芍藥二錢
枳殼八分 連翹 牛子各二錢 燈心五節

柳花散

柳花七錢 紫草一兩 升麻七錢 當歸八錢 赤芍六錢 共為末
每服七錢 葡萄酒煎湯下

女子發痘又值行經。經水方止。身發壯熱。狂言譫語。如見鬼
神。尋衣摸床。顛狂百出。目上直視。煩渴不寧。此陰虛似實切。
不可以實熱治之。蓋行經之後。血室空虛。心以生血。血竭則。

心神不寧。肝以藏血。亦且藏魂。血盡肝虛。而神魂自不能安。此狂譫之所由來也。痘未出。宜以逍遙散。加丹皮。王之痘已出。宜以加味歸脾湯主之。又有邪熱乘虛而入血室。以致于狂譫者。古人以瀉肝散治之。愚謂仍以加味逍遙散加防風。斯可矣。

一女子正值崩漏。適逢出痘。則氣血俱虛。必不能逆毒出外。急宜大補血氣。否則痘不能出。雖出亦易倒陷矣。遇此之症。速以十全大補湯。或參歸鹿茸湯三之。

一女子一向閉經。血海已涸。適逢出痘。毒氣鬱於衝衛之間。一陽并發。其熱必甚。其症最危。切勿誤用攻墜之藥。使血妄行。致

養心補血調理脾胃為主仍用歸脾湯加解毒藥或用

遙散主之

瀉托散

姜活六分 當歸一錢

枝子

胆草

酒洗各六分

川芎

防風

各八分

炒芍

六分

柴胡

木通

各六分

淡竹葉

引

歸脾湯

人參

黃芪

白朮

茯神

各一錢二分

甘草

三分

木香

各五分 遠志

全地

棗仁

各二錢

加柴胡

山枝

名加味

歸脾湯

逍遙散

白朮

茯苓

當歸

白芍

生地

甘草

柴胡

加枝仁丹皮名加味逍遙散

十全大補湯

人參 黃芪 白朮 茯苓 地黃 官桂 川芎 當歸
白芍 甘草

女子起脹灌漿

一女人出痘當起脹灌膿之時忽然行經恐血虧裏虛痘易倒
陷急宜大補血氣用十全大補湯或參歸鹿茸湯主之

參歸鹿茸湯

鹿茸二錢 人參二錢 炙芪一錢 歸身二錢 炙甘草七分 薑二片 龍眼
三個 八好酒一盃 全煎

考。此病起發之時其經忽來而不能盡。謂者此乃血虛之甚。而少陰之脈不能上榮于舌也。宜以當歸養心湯主之。其能言復用十全大補湯主之。

當歸養心湯

人參 麥冬 生地 炙甘草 加燈心引

一女子虛當灌漿之際。經水大來。血虛不能化毒。以致其痛。痛起不起。應墮不墮。頂陷灰白。皆由血去過多。陰氣耗散。故也。急用調元內托散主之。外用胡荽酒噴之。使血起。將行。或於空處。又出一層。則爲吉也。若服此不效。寒戰咬牙。喘急。腹脹。反增他痘。則內氣已脫。必不治矣。

調元內托散

人參 黃芪 肉桂 木香 當歸 川芎 白芍 附片

孕婦出痘

夫妊婦出痘。痘家最忌。蓋痘毒出於五臟。痘毒發越。則風火相搏。必致動胎。胎動則氣血耗散。勢必不能送毒。行漿。況痘家用藥。多主溫補。如半夏。肉桂之類。皆爲妊婦所忌。而黃芪。烏藥。諸品。又非痘家所宜。此妊婦出痘。所以最難調治也。遇此痘。總以清熱安胎爲主。故初熱血動者。以四物湯加參。連生之。或用單胎散。主之。必使胎元莫動。而後可無虞也。

四物湯

當歸 川芎 熟地 身

見胎散

當歸 川芎 白芍 人參 白朮 茯苓 柴胡 甘草
條芩 防風 荆芥 白芷 乾薑 砂仁 紫葦 阿膠
倍梗

一妊婦出痘身熱腹脹手足冷者用八物湯加木香主之

人參 黃芪 白朮 當歸 川芎 白芍 熟地 甘草

一妊婦出痘而胎將動者急用安胎散主之恐胎落則痘隨也

川芎 當歸 白芍 人參 白朮 茯苓 黃芪 甘草
砂仁 陳皮 阿膠 香附 艾葉 各等分

胎落而瘦稠密者用人參黃芪川芎當歸防風

白芷白芍桔梗厚朴木香肉桂紫葳牛子

一產後寒戰咬牙者裏虛甚也宜大補湯加桂附

一產後小腹急痛者瘀血未盡也宜用黑神散以重行之

黑神散

當歸川芎熟地炭薑桂心蒲黃厚木香陳皮

黑薑炒香附炒水酒各半煎服

生產之後然後出痘者總宜大補血氣為主須照常體用

藥不必妄為多疑而反致變亂也

訣曰 妊婦出痘治應難 其法宜早服此散 清熱安胎為

妙法 胎元若動病終難

又曰 產後天行出痘瘡 此時平順不須惶 只將大補加

功效一謾向諸書覓檢方

總之妊婦出痘要以安胎為主若胎已落法以補血為主但收
醫時胎落者多無事發熱初出時脫落者猶或可救若當起
脹瀰膿時胎落者多致不救治者須宜知之

痘疹新書卷之十終

新書卷之十一

寧邑張琰遜王氏編輯

受業曾德波全系

麻原賦

麻雖胎毒却因疫時而敷暄熱非令大寒逆時傳染而行遍平

州星其毒發也與痘相異其變症也此痘非輕愚夫視為泛常

緊論其原

頃刻殞人性命此其所以然者蓋毒起於脾熱流於肺心始終

之惟腎無症故非髓內之殃而臟腑之傷肺則尤甚閉門閉途

不若路中尋徑湯湯止沸不如去火抽薪吾試言其始末而與

天下詳呈初熱亦似傷寒目出疾而不止甚流涕而不散咳嗽

太急煩燥難言以火照之隱隱在皮膚之下以手摸之發熱
肌肉之間其形如芥其色如丹隨出隨沒乍隱乍現想其腫
兮痲而兼隱皮膚如赤兮痲而夾斑似錦而明兮十有九活如
煤而黑兮百無一生症雖變異治法不同微汗常出毒勢越而
不留清便自調邪氣行而無壅滕理弗開兮恐毒鬱而不洩即
當發表為貴腸胃秘結兮慮熱滯而不通急以疏利為先苟不
慮終而慎始正恐變吉為凶其初不必憂邪從血解利不必
止毒以利鬆所害者身上清涼所畏者喉中腫痛飲水不休法
在生津養血飲食若臧方須救胃和中且出之太遲或為風寒
所束法在急於發表出之大甚藏腑積熱愼多治之為宜解毒

雜醫因時母干天和。當視歲氣。若其風溼。毒氣鬱而不行。
火月炎炎。和氣聚而作癰。或施溫補。勿助其邪。若用清涼。伏傷
其胃。制其過。但取其平。驅其邪。勿傷其正。或寒或熱。藥性之陰
陽。自異。為虛為實。人生之強弱。不齊。欲與溫涼。必觀虛實。人品
固宜詳觀。藥味亦當深究。防風荆芥。散勝理之。留邪升麻。葛根
開榮。衛之。蘊熱點子。未現之初。乃先行之。要藥人參。益氣地黃。
涼血氣。虛血熱。非此難安。黃連入心。而瀉火。黃芩入肺。以清金。
熱留心肺。非此莫除。玄參石羔。治邪火之浮游。核子連翹。開腸
毒之鬱結。此疹家之要藥。解毒方中。必用瓜葛。潤肺止渴。須有
麥冬。知母。降火生津。必同黃柏。當煩渴在所。必加黃芩。往平腹

痛白朮止乎脾泄小便瀉令其通咽喉痛令甘桔湯補肺令
以長砂大便秘令利以大黃牙齒生疳文蛤配手濁白喉痺咽
痛射干助以牛蒡五味杏仁治喘氣之噓噓薄荷竹葉解肺熱
之炸炸火燒人尿密炒麻黃發毒之出現令邪氣之抒張只
壳山查消脾積而化毒地骨解肺熱以回瘡疥疹既出調
理甚難坐臥宜煖飲食宜淡風寒若受令為腫為熱鹹酸不
分為咳為喘穢若觸令發痒嚴寒搏令消渴調理失宜輕而變
重飲食不節安者反危以致變症多端餘殃莫測御便多腹
心腸胃火熱咳多痰涎令華蓋俱寒口爛唇瘡心脾之火未退
毛焦髮稀榮衛之液將枯治此變症各有奇方身熱不除柴胡

乾葛四物曰瘡若甚柑桔對平三黃消腫定喘今意麻有效化
痰止咳今順氣爲良氣血已虛八物增損而可用木槧不納一
陳斟酌以相當刺血今香連丸去寇而加地榆琴栢咳血今五
梅湯去麻而加茅根地黃此疹家之治法繼痘科而更詳

麻疹西江月 共十三首

胎毒現爲麻疹蓋因毒火薰蒸遍身點似硃砂形乃是心脾二
症切忌薑蒜死候最忌赤似朱紋大都治法喜痛不可辛
十已六

疹子何因咳嗽只因肺與心連肺被毒火苦熬所致生咳氣
喘治宜清金降火不可悞用辛熖譬如胞子蒸籠病只要氣

熟火善

初熱狀似傷寒其症如何分辨症多咳嗽有紅斑點眼中水
現或見腹中疼痛或時吐瀉相兼疹家吐瀉不須驚恐因陽
泄而鮮

疹與痘家異治。一家不可同方。痘宜溫補。疹宜涼。只要現形爲
上風寒閉而不出其間凶險難當。急宜發散。保平康。最怕神
昏腹脹。

凡遇疹子出現。詳看時令如何。假如日暖及風和。敗毒制防。方
可。若是時行疫熱。毒連消毒。甚多。用心調理。救沉痾。莫效。觀
天井坐。

目說荆防敗毒此爲發散仙方防風荆芥地黃湯炒製芩連
樣桔梗玄參甘草連喬升麻牛蒡人參炒柏酒爲良竹葉水
煎停富

又有芩連消毒散火散毒尤佳芩連枝子及升麻桔梗玄參多
把石羔以及知母連喬牛子紅花引用淡竹要多加此個方
見無價

若是發散不出令人真個憂疑麻黃酒蜜炒如煤芩連枝柏當
施更加大黃酒製連喬牛蒡相宜石羔也退紫紅歸不效命
離塵世

如見出時紫黑此症今古多凶急求人驚路歸東火燒存性取

用細研酒調吞下須臾黑色轉紅若還依舊黑膿血管取黃
梁一夢

疹子現形發熱化痲湯是真傳石羔甘草玄參桔梗連翹有驗
若見毒多熱甚連翹消毒爲先大便秘結大黃添務使微瀉
數遍

疹子類多咽痛火邪薰灼無他連翹甘桔夢多加射干牛蒡前
罷外用十宣妙散吹喉休要呼嗟假如見效莫爭差消毒不
連無價

赤痢下時鮮血黃芩芍藥槐花只壳荆芥穗同加痢止血除方
龍目痢菜黃滑石枳椇根只壳升麻烏梅取肉作丸佳赤白香

連可下

四疾更防死症。臨時休得殊差。毒多體熱。瘕如麻。咳嗽而毒發。
啞走馬牙崩。齒落痢疾。禁口。吁嗟。此班卽是死。楚家不可騎。
牛問馬。

痲症辨論

夫痲痘皆胎元之毒。痘乃父精母血。陰陽交媾。慾火所鬱。藏於
命門。是爲陰毒。痲乃受胎之後。在母腹中。飲食積垢。色慾凝滯。

辨毒之原

蘊於六腑。是爲陽毒。蓋毒藏陰分。貴陽氣之壯旺。而毒乃得上

論治法。去有陰陽。則化之妙。

升而外化。故治痘之方。必用參芪朮桂。以陽藥而化陰伏之邪。
毒在陽分。貴陰血之活動。而疹乃不焦黑。而內攻。故治痲之法。

多用四物地黃以滋陰而降燥烈之火。此麻痘之藥品。所以畢施。況陰主閉藏。故痘毒深而難解。陽主發散。故麻毒淺而易消。且臟陰多虛寒。故治痘之法雖解毒亦要溫中。腑陽多實熱。故治麻之道宜發表而尚清涼。痘毒必須外化。化盡方可無虞。是以遷延時日。治始貴虛。其終麻毒但要發出。出盡則無後患。是以時日無多。治此只須解表。然麻毒雖藏於腑而陽毒之激烈一發即蒸於肺。肺主皮毛。寔受其毒。故發熱之初鼻流清涕。咳嗽噴嚏。音啞咽疼。而肺經見症獨多。而其所以異於傷寒者。此症之異於傷寒祇有眼痘。畧腫目內汪洋。而腫腮赤。是以知為麻症耳。其初發也。此理止。最忌風寒。尤嫌濕觸。宜置之潔淨之所。處于溫煖之室。幸甚。

之物恐助毒火萬勿與膏生冷之藥處求毒氣切莫與食藥
宜有香薰而使機不能觸用藥必須發散以開肌表之膚蒸騰
理開張而毒不內鬱馨香時接血毒得外升此初熱之調理再
觀症而察形若潮熱往來二便不秘飲食如常精神清爽身潤
澤而有汗唇不紫而自榮舌無黃白之苦日無腥臭之氣此其
內毒最輕知其症之必順不須用藥費心動自可安然平定若
鼻衄吐血請君不必驚慌毒從衄解有何妨此症從不危凶
嘔吐毒攻胃管泄瀉莫作虛看腹痛多為內熱驚譫心經火旺
利以發散為貴再以清解為良發熱三日以後麻疹已現皮膚
以燈照之如霞如錦以手摸之如粟如麻一日而出三遍三日

而出九回至于五六日間痲毒盡出其熱漸退熱退公奏其症
方平當其現形之際不畏瘡之稠密惟喜色之紅活故色之明
潤雖一片成瓊吾亦知其堪救若瘡來紫黑雖稀疎不爲吾亦
謂其難醫是以紅色者輕紫色者險青黑色者則爲不治之症
矣蓋血以載毒血活則毒必清毒壅則血必熱紫而轉黑則毒
凝而血已死矣其又安能活乎治此之法如黠來焦紫必以清
毒爲主九以涼血爲先凡芩連枝柏蘗芩石羔玄參知母甘桔
荆防一切清肺解毒之藥此時不容緩進至于紅花歸尾紫草
地黃丹皮赤芍荆芥川芎一切滋陰活血之品當此急進其方
雖人有強弱不可西體弱而後進補劑以致助毒爲慮在

之見不過於解毒劑中用人參而專扶元氣。雖雖執症亦不
因症熱而過用寒涼以致耗其元氣。當熱清毒解之餘則宜調
其脾胃而思固其本原。若熱盛而藥微則杯水固難救事。倘
毒輕而藥重是驅盜自傷其門壁。均非所云善治。惡之未出
之先宜發為主。發毒盡出自不內攻。雖紅腫之甚。狀若癰瘡亦
不足慮。既出之日。橫以解毒為良。毒清血活。方能化於皮膚。方
免餘毒之禍。調理得宜。十有十全。苟失其宜。殺人亦如反掌。治
瘰之與痘又安可不慎乎。

概論治法

瘰即疹也。疹形如麻痘形如豆。因象命名。故呼瘰痘。夫瘰瘰皆

胎毒痘出五臟屬陰而主血故痘有形而有汁其症有寒
亦有熱麻出六腑屬陽而主氣故麻有形而無漿其症多寒
熱而無寒爲症既異則治法亦殊蓋痘宜內寔可用補劑麻忌
內實只宜解散惟初熱之時畧相似耳若既出之後則痘宜補
氣以生血麻要滋陰以制陽蓋陽毒燥烈在陰血受其熬煎勢
必至于虛耗故必以滋陰降火爲主斷不可用燥悍之劑扶陽
以助火邪也是以治麻之法宜清不宜補也

麻症與傷寒辨

發熱之初寒熱往來咳嗽噴嚏鼻寒聲重目流清涕其症與傷
寒無異但麻症則眼胞壘腫目淚汪汪而唇肥赤惡心乾煩此

爲異耳。若見此症，必是發疹。須宜謹風寒，節飲食，避厭，成黃
酒忌。幸熱用藥，表散使肌膚通暢。腠理開張，或身有微汗，則邪
從汗解。而毒則易出耳。熱至三日，麻當出矣。一日出三遍，三日
出九遍，至六日間，當出盡矣。及出至足頭面，將收收壓之處，其
熱即退。疹子漸次收下，熱亦漸次而退。至八九日，麻始收齊，而
熱乃退盡也。若發不出者，固危。出不盡者，亦險。出而旋收者，更
險。治之，其可緩乎。

論麻症輕重

或熱或退而無他症者，輕。

頭面不出者，輕。

出透三日而後漸收者，輕。

紅活潤澤，頭面均淨而多者，輕。

紅紫棕暗于焦不潤者重

移熱大腸變黃者重

黑暗乾枯一出卽沒者死

鼻青紫黑者死

鼻扇口張目無神光者死

胸高氣喘心前扇動者死

又眼白赤色聲啞唇腫心煩目渴腰腹疼痛口鼻出血人事不
清大小便秘狂亂不寧舌苔黃黑口氣腥臭此名閉症毒滯
于中而不得出將作內攻最危候也急以清毒解毒湯主之
若疹能出可救發不能出則死

升麻 防風 荆芥 麻黃 連翹 牛子 桔梗 石膏

知母 黃芩 黃連 虫退 麥冬 甘草 加無價散

麻症鼻衄血者毒重口出血者毒尤重初起手足心如火熱

者。毒亦重起。初失于清解。則熱蘊于胃。口鼻腥臭。必生牙疳。毒入大腸。則成痼痢。發表太過。元氣損傷。則成疳積。若或失治于前。其必貽患于後。雖明初發之重輕。宜顧後來之生死。誰謂痲也。祇詳于前。而可不思其後乎。

又有一種為感風熱而出痲者。俗謂飄痲。此皮膚小癢。不致傷人。祇散風清熱。而卽愈矣。

有小兒初生。彌月之內。而出痲者。俗謂胎痲。可不藥而愈。

○痲家四忌

忌葷腥生冷風寒。六穀氣通。肉氣滯。凡是帶腥。俱能滯毒。所以忌也。葷生則難化。化物冷。則能冰伏。冰伏不化。毒乃滯。

留又當忌也。若風寒閉塞，毛竅不開，則毒氣何由出乎？此數端者，是以俱莫犯也。

一忌驟用寒涼。麻雖熱症，固不宜用辛熱之劑。然初執之際，虛愈之症未形，輕重之勢未見，遂驟以苦寒之藥而峻攻之，幾何不冰伏其毒而不得出其反？至于內攻乎？故善治者，惟達勢而不鬱，毒祇解毒而不冰，詳也。

一忌誤用辛熱。麻本熱症，若復投辛熱之藥，是猶火上復加薪也。斯以火助火，其毒不愈，橫乎然。麻症初起之時，亦有四肢厥冷者，此熱極似寒之故，切不可誤認虛寒而妄投以熱藥也。卽遇天時太寒，亦宜置煖室，切不可因寒而遂投以

辛熱之物以濟腹中之火也

一忌誤用補瀉。毒火之發最速。疏通尤嫌補瀉。蓋毒通則毒得外洩而解。補瀉則毒滯內留為殃。但初發之時症多吐瀉。愚夫愚婦急欲止之。若誤用參朮砂仁補瀉之藥。則關門閉盜。毒滯于中。必作內攻之禍矣。

○孟氏治麻方。前後諸症並治。

石膏^{二兩} 川貝^{四錢} 紅花^{三錢} 荆芥 骨皮 桔梗^{各八錢} 葛^{一錢}
歸尾^{一錢} 甘草^{四錢} 桑白皮^{一錢} 赤芍 牛子 薄荷 陳皮^{各六錢}
只壳^{六錢} 共為末。每服三錢。白湯下。

此方能發表透肌。清毒活血。理肺消痰。清胃解結。不拘四時。

皆可以服誠治麻之良方也

○麻症初熱三日調治法

夫痘爲陰毒其勢更緩或死或生倘判之于成壞之日麻爲陽毒其熱甚烈若存若沒早定之于方出之時故發熱三日麻當現於皮膚若腠理緊秘風寒嚴束氣滯于中毒凝于內不能出現則毒作內攻須與告變故痘則慮難成壞麻則懼其不出此麻前痘後最爲緊要古今之通議也當發熱三日之間急宜觀形色察聲辨症以爲調治之方如聲重鼻塞肌慄惡寒甚風寒所束宜用

加味升麻湯

升麻 乾葛 防風 荆芥 牛蒡 連翹 桔梗 水通
赤芍 甘草 柴胡 黃芩 陳皮 虫退 玄參
右加葱白。水煎熱服。令取微汗。一二服間其麻即出。
如大熱。蒸肌膚乾燥。目赤唇紫。毛髮焦脫。煩渴不寧。驚狂顛
譫。二便秘結。而出不快者。乃熱毒盛壅。故也。宜用

移仁解毒湯

枝子 黃芩 黃連 石膏 知母 牛子 連翹 升麻
柴胡 防風 赤芍 甘草

大便秘加酒大黃 煩燥加麥冬 嗽甚加杏仁 桔梗
驚譫用鎮驚丸方見九 無汗腠理秘加大黃 再用紫

水令熱氣薰之。或用酒遍身擦之。然後以被蓋片時。卽出。治風寒閉者。亦如是一。若爲穢氣所觸。而出不快。則用沉香檀香荊芥燒烟薰之。

又有毒氣木盛元氣又虧。而出不快者。則用

人參白虎湯

人參 錢一
石羔 錢四
知母 一錢五分

加升麻 防風 牛子 炒苓

治痲須明時令。蓋春夏秋冬之不同。陰陽寒暑之各異。時令既殊。治法亦異。

時令溫煖。而出不快者。以辛涼之藥發之。宜用

防風解毒湯

防風 荊芥 薄荷 石膏 知母 桔梗 牛子 連翹
木通 貝元 升麻 甘草 加灯心水煎服
如時令膈熱而出不快者以辛寒之藥發之宜用

黃連解毒湯

防風 黃芩 黃連 荊芥 知母 石膏 黃柏 枝子
大青 玄參 桔梗 木通 甘草

如嚴寒大連冷氣通人則以辛熱之藥發之宜用

桂枝解毒湯

桂枝 麻黃酒 赤芍 防風 荊芥 羌活 桔梗
甘草 人參 川芎 牛子 生薑引乘熱服

如時寒時煖而出不快者則以辛平之藥發之宜用

升麻解毒湯

升麻 乾葛 甘草 柴胡 前胡 赤芍 牛子 桔梗
防風 羌活 連翹 甘草 人參 淡竹葉引

又不論四時寒暑而出不快初熱並用

宣毒發表湯

升麻 乾葛各八分 防風 桔梗各五分 荆芥 薄荷各三分 牛子
連翹 前胡 貝壳 木通 赤芍各六分 甘草三分 大黃加
炒苓 大寒加麻黃密炒 犀角竹葉引 寒用生薑引

此症最難一時不得出所以必元明識人看時寒熱審人強

弱調理故散如前用藥發散疹即隨現而透出者其毒盡解而無事也若發不出宜用再加味麻黃湯發散之外用生薑酒糟蒸熱擦之自頭上至足為齊若出現而頭面愈多者為佳若遲延口久而不能出腹脹氣喘昏迷不醒悶亂者則必死矣

加味麻黃湯

升麻酒洗 麻黃蜜炒 人參 黃牛 子 山退去翅足 等分生薑引

發熱之時遍身自汗者此毒從汗散腠理開張其疹易出也又有鼻中出血者亦內症不開毒從衄解也二者俱不可遽止但汗出太多則恐津液耗散表虛過甚致生他症宜用當

歸六黃湯加麥冬以止之。血出不止又恐陰血耗甚不能生津降火。宜用茅花湯以止之。若汗多衄甚。置而不治。則元氣虧而精神散。則正氣弱而邪必橫。將毒內攻。倒戈反掌。致成莫救。良可嘆也。

當歸六黃湯 治自汗盜汗

當歸 黃芪 黃芩 黃柏 生地 熟地 加麥冬

敗蒲扇燒灰調服

茅花湯 治衄血

茅花 歸尾 丹皮 生地 甘草 加玄參 百草霜 同煎

犀角地黄湯 治火血

犀角 芍藥 生地 丹皮 外用髮灰吹入鼻中其血即止

一初熱煩渴大甚者用人參白虎湯方見前壯旺寒熱者去人參大熱不退而渴甚者加竹葉麥冬

發熱之初或疹出之後一切咽喉腫痛不能飲食者乃毒火薰蒸上冲咽喉故也宜用甘桔湯主之更以十宣散或玉鎖匙吹之自愈切不可妄用瓦鋒刺其碍處令出血也刺破則必爛矣

甘桔湯治喉痛

桔梗 甘草 牛子 連翹 玄參 黃芩 山豆根

水煎所喻

十宣散 吹喉口

黃芩炒 柏各二錢 苦參二錢 礪砂煨 玄明粉各七 乳香 三分

兒茶一錢 雄黃一錢 水片一分 共為細末吹入喉口中口將水可服之

玉鎖匙 吹喉口

礪砂 朴消 薑虫 冰片 共為細末吹入

二聖散 吹喉口

苦參三錢 薑白一錢 共為末吹入

發熱之時或吐或瀉背毒氣內逼而面欲奔越故吐瀉也吐者毒逆上行攻于胃管因吐而毒乃解瀉者毒越下降泄行

大腸因瀉而毒乃洩故大吐大瀉俱能洩毒是為順症不必
施治俟屎出而吐瀉自寧所可慮者欲吐不吐時時張口而
作乾嘔此毒雖入胃而不能出誠險症也宜用玄參解毒湯
與灯心竹葉湯主之

玄參解毒湯

玄參 黃芩 炒枳 栝梗 甘草 生地 乾葛 荆芥
灯心竹葉湯治乾嘔

淡竹葉三十 灯心三十 合前方並煎 或加木通 車前

活石引熱下瀉膀胱則不上逆于胃而嘔自止矣

又如泄瀉雖云順症然瀉若太甚又恐傷脾須用加味四苓散

主之 最可慮者欲泄不泄裏急後重時時欲去澀而不下

此實熱滯于大腸將成痼痢之禍宜用黃芩芍藥湯主之

又謂治白利者用升麻澤瀉湯 治嘔吐者用竹葉石膏湯

加味四苓散 治水瀉

白朮一錢 赤茯苓一錢 猪苓八分 澤瀉八分 木通六分 車前六分 牛子七分

黃芩五分

黃芩芍藥湯 治麻瀉下裏急後重

炒芩 赤芍 升麻 甘草 生地 木通 貝壳

歸稍各一錢 川連八分 人參六分 加酒大黃以利之

升麻澤瀉湯 治泄瀉

獐菜 澤瀉 滑石 赤茯苓 甘草 川連 升麻

等分煎服

竹葉石膏湯 治麻嘔吐

陳皮 法夏 石膏 茯苓 竹茹 甘草 水煎服

凡麻症初熱吐瀉切不可妄用緩胃補脾溫滯之藥恐滯毒于內而不得出以貽後悔也

一發熱之時未有不口渴者治渴之法但當以萊菔心炒米湯飲之以人參白虎湯佐之方見前使其生津解熱渴自止矣

若悉飲冷水悲生水蓄之症盛水入于肺為喘為嗽宜用竹瀝以洩肺中之水水入于脾為腫脹為自利水入于胃

爲嘔爲噦須用猪苓澤瀉茯苓以洩脾胃之水 水入于心
爲驚爲悸宜用赤茯苓木通以洩心下之水 水入于脾爲
脇痛宜用薤白以洩肝脾之水 水入于腎與膀胱爲小便
不利爲陰囊腫脹宜用車前木通以洩膀胱之水俱隨症用
藥以調治之不可執一而不通也

痲症既出調治法

夫痲既出則毒之重輕症之順逆觀形察色可以宜知不可不
詳辨也庶使症之輕者不必過慮而妄治重者則不容怠忽
而不治也

凡痲從耳項腰腿先見者吉蓋腠理既通筋骸不滯故洗身

此預知其毒必能盡出也

凡痲頂負而不甚脹彩小而均盡出者吉蓋氣盛毒輕故圖小而盡送于皮膚之外也

凡痲紅活潤澤鮮明光彩者吉蓋血活毒輕必能化毒也以十順症皆不必服藥但慎風寒節飲食善為調護而已

如痲色白皆血不足也宜用

養榮湯 治痲色白

當歸 川芎 紅花 赤芍 人參 甘草

如痲色紅赤如朱者乃血熱而兼火邪也宜用化斑湯主之

參白虎湯佐之失治若變紫色則險矣 人參白虎湯方見前

化斑湯

治麻色紅赤

人參 知母 石膏 牛子 連翹 升麻 地骨皮

淡竹葉 甘草 糯米 水煎以米熟為度

如麻色焦紫乾紅慘暗不明者乃毒盛火熾五死一生之症急宜涼血解毒滋陰降陽用加味四物湯主之或辰砂益元散

方見九散條 或大青湯或玄參

選而用之

加味四物湯

治麻入紅

當歸 川芎 生地 赤芍 丹皮 前胡 乾葛 連翹

牛子 紅花 甘草

天青湯

治麻紫黑乾燥

玄參 大青 桔梗 知母 升麻 石膏 梔子 木通

人中黃 水煎入燒入蜜調服

如麻色黑者則熱毒尤甚為十死一生之症須用大青湯或用

紫草解毒湯

麻黃 紫草 紅花 川甲 人中黃 蘆根 金龜

川連 燒入糞 出退 牛子

一痲症發表之後疹子出于皮膚之間此時切宜謹慎風寒莫犯生冷若為風寒所束閉鬱肌膚或為生冷所水毒不能出則滯身青紫毒入內攻雖有良醫莫能救矣

一痲已出血復沒者乃風寒所觸而毒氣退縮也若不急治則

必內攻而死矣。宜速用消毒升麻湯乘熱服之。則疹或能復出。不然其必死也。

消毒升麻湯

升麻 乾葛 荆芥 牛子 赤芍各錢 甘草 生薑引

一兒元虧毒盛。麻出復沒。目閉無魂。口不能言。請余往視。余曰。此毒隔內攻。不能療矣。其父母哀告再三。求賜一方。余思非參連湯不可。乃曰。如必欲治。須用人參五錢。川連五錢。減分厘。亦不見效。其家果依余言。用參連各五錢。全煎一碗。與服。奈不能進藥。以茶匙灌入口中。即從口角溜出。余曰。難進。亦有三分之一匙。下宜略遲之。再緩緩灌下。及至夜半。

其藥性已行乃能斡藥及藥服完至次日天明其服方開曰
方能言仍用前方與服竟愈蓋非連之多不能解其勢非參
之重不可扶其元此重藥而祛重病之故也

一麻出之時咳嗽口渴而心煩悶者此毒在心肺二經而發矣
盡也宜用瀉心湯或黃連杏仁湯主之

瀉心湯

治麻咳嗽煩渴

桑白皮

炙

地骨皮

甘草

淡竹葉

灯心

加花

連翹

玄參

川連

川貝

等分水煎服

黃連杏仁湯

治麻咳嗽煩悶

川連

酒炒

陳皮

去

杏仁

去皮

麻黃

去

只壳

炒

乾葛

薑引

一痲出之時咳嗽氣喘唇紅舌赤熱伏于內煩燥不安口鼻出血者此實熱不宣也不拘前後宜用

化痰清火丸

犀角一兩歸尾錢八連翹兩一赤芍錢六牛子錢五生地兩二丹皮錢一

川連錢四共作細末煉蜜爲丸如彈子大竹葉湯下

一麻出之時自利不止或瀉稀水頻數不休者最爲要候宜看其疹如何以爲施治若疹稀色淡其毒本輕而作泄者乃脾氣本弱不能制水而又積垢于腸胃使陰陽不調水穀不分而泄也宜用和胃四苓散治之若痲稠密而紅紫之甚者益毒注大腸幸世而解貝用平胃散加乾葛連翹以解之疹一

若依期而收自然瀉止若疹收而瀉猶未止仍是疹未
盡須須用前方加連翹半兩木通車前澤瀉猪苓治之自愈
若用柯慈栗壳止瀉之藥則滯毒于中重則腹脹病瀕喘急
而死輕則必成痼痼以爲休息之症也

和胃四苓散

蒼朮 厚朴 赤茯苓 猪苓 澤瀉 神麴 山楂
白芍 香附 陳皮 木通 炙草 或加肉桂
平胃散

蒼朮 厚朴 甘草 陳皮 猪苓 澤瀉 加乾葛
連翹 升麻 等分水煎服

小兒體性怯弱氣血兩虛而出疹症痲色不紅者此病後之
兒身體瘦弱而出麻者宜用

加味逍遙散

怯弱之兒而臨疹症
已出未出供宜用之

白朮 白芍 薄荷 茯苓 當歸 丹皮 陳皮 柴胡
甘草 麥冬 乾葛 等分水煎服

一 痲已出稠密不堪紅腫太甚或一齊權出者皆毒熱熾熾之
故但已出于外未留于內必不至于傷生須清火解毒自獲
平安不必過為驚惶也此等只宜用

化毒清表湯

治痲紅腫太
甚一齊湧出

生芎 妙連翹 花粉 地骨皮 川連 黃芩 山枝 梔子

知母 乾葛 玄參 各八分 桔梗 前胡 木通 各六分 甘草

薄荷 防風 各三分 如口渴加麥冬 去心二錢 石膏 標三錢 大便秘

結加酒大黃 二錢一分

右方解毒鬆肌清痰降火除五內之鬱熱散肌表之火邪

滌腸胃之滯垢痲毒甚者不拘前後俱宜用此

一疹子之出常以六時為度如子後為陽午後為陰如陽候出者至陰分而收陰候出者至陽分而收此陽生陰成陰生陽成造化自然之妙故漸出而漸收者合乎陰陽消長之証其毒輕而症順也若痲出之後大熱不退連綿三四日而不收者此毒火大甚邪發未盡內留餘熱臟腑壅滯所以外疹難

痲症出見治法

喉也宜用化班湯方見前或用消毒飲主之或用前化毒清

表湯主之俱可方見前

消毒飲治癰紅腫難收

荆芥錢二牛子錢二連翹錢二甘草分六石膏分六玄參錢二桔梗

前胡錢各一黃芩錢各一花粉錢各一防風錢各一木通錢各一水煎服

一疹子既出熱宜漸退若遍身俱出猶沸沸大熱煩渴不寧而

頻頻惡心而作嘔吐者此毒發未盡尚留于肺胃之間宜用

前化班湯主之方見前或孟氏治癰方主之方見前如大便秘者

俱加酒製大黃微利之如或失治必生他症矣

凡麻見形之後宜服清熱解毒之劑使毒能化而熱自退庶幾

後無變症也須用

解毒快斑湯

連喬 牛子

防風

荆芥

各六分

虫退

五分

山查

錢二

歸尾

六分

生地

錢二

桔梗

各八分

炒茶

各八分

川芎

五分

乾葛

各八分

紫草

五分

右方用觀音柳少許全煎多則不可

凡麻既出其形色紅活上升有漿影者其毒盡化最為上也收結之時竟有痂壳如疥癩者最為吉也出齊之後其熱漸退收盡熱亦盡除則無餘毒為殃矣

麻症收後餘症治法

一疹既收之後其熱已宜盡退而反渾身發熱晝夜不退者

此毒散未盡邪火鬱于肌肉之間故如是之復熱也若不急
解餘毒以退其火久則毛髮焦脫皮膚枯槁為骨蒸癆瘵之
症矣故當其始也餘毒發熱宜用解毒散及其繼也漸成癰
瘡則用蘆薈肥兒丸或清熱除疳丸治之遲則變誤脾之症
不可救也

解毒散

連翹 牛子 知母 玄參 荆芥 前胡 地骨皮

黃芩 山枝 木通 甘草

蘆薈肥兒丸

治疳後發熱晝夜不眠
肌膚瘦癯癆瘵之屏

蘆薈

炒胆草酒洗

木香

磨訶皮

人參

使君子肉

檳榔 黃連去虛積酒炒 白燕黃名三錢 胡黃連五錢外加當歸連

各三錢 共為末用猪胆汁糊為丸如黍米大每服五六十丸米

飲送下若緩而不治至眼睛露目口鼻氣冷手足厥逆則必

死矣

清熱除疳丸 治全前

川連 當歸各二錢 龍胆草一錢五分 川芎一錢 青皮 陳皮 使君

子肉各一錢五分 乾蟾頭一錢五分 薑黃一錢五分 胡黃連二錢 神曲二錢

共為末米糊為丸米泔水送下

一疳收之後身雖不見羸瘦但時發壯熱煩渴不寧驚搐顛語神昏智亂如見鬼神者此陰血衰耗致毒邪入肝而傳于心

故也。治宜安榮養血。定志寧神。須用當歸養血湯。與諸神效
神丸主之。

當歸養血湯

當歸 川芎 生地 麥冬 木通 棗仁 甘草

淡竹葉 山枝仁 灯心湯引 大便秘加酒大黃

黃連安神丸

黃連 胆草 石菖蒲 茯神各 當歸一錢 全蝎七個

共為末湯浸蒸餅和猪心血為丸。硃砂為衣。灯心湯下。

又痲後驚搐。余常用鎮驚丸亦效。方見九散條。

痲後面青唇淡。精神困倦。氣血兩衰者。宜用。

調本健脾湯

治痢後瘦弱成疴

枝苓 人參 黃芪 丹皮 沙參 白芍 甘草 當歸
百合 以仁 麥冬 各等分 如有洩瀉瀉白色者加木
香白朮 柯子少許瀉黃色者加炒芩車前
一麻後失調體倦氣虛或成疴積泄瀉等症宜用

健脾肥兒丸

人參 五錢 炙甘草 二兩 神曲 炒二兩 查肉 二兩 麥冬 六錢 白扁豆 炒
炒二錢 白芍 錢六 吉紅 錢五 當歸 八錢 陳皮 錢五 地骨皮 錢六 白茯苓 一
淮山 一兩 百合 八錢 白朮 炒二兩

共為細末煉蜜為丸如彈子大空心白湯送下

一痲後毒流入胃致牙齦爛口臭牙疼常出血爲走馬牙
疳及兩頰浮腫久而穿頰破腮缺唇崩齒追齒落盡而後乃
死此最危之症甚堪慮也其初牙疼血出或口臭時卽宜以
清胃化毒湯或噙且服甚則用文蛤散與雄黃散搽之又用
人中白散或清胃敗毒散與服又外用救苦散以搽患處亦
或有能愈者然牙疳旣甚則不治者恒多也

清胃化毒湯

石膏^{三錢}甘草

牛子

連翹

生地

炒苓

板柳^{各二錢}

使君子肉^{六分}

紫草^{六分}

金銀花

煎水時噙與服

人中白散

治牙疳

人中白即鹽麝香使君肉桂龍胆川連澤瀉

脂等分為末蒸餅作丸服

清胃敗毒散治牙疳

鼈虫 丹皮 甘草心 連翹心 生地黃 金銀花

桑白皮 沙參 茯苓 黃柏炒 等分服弱者加白朮

文蛤散治牙疳

雄黃錢五 梔子錢一 枯礬錢一 退紙燒灰

共為末先將清茶或米泔水洗淨然後以末藥敷之

雄黃散治牙疳

雄黃錢一 石膏錢一 蛇床子錢一 共為末先以艾葉煎湯洗淨然

後用此末藥敷上 又有加葛葉燒灰者更妙

救苦散 治牙疳

人中白錢青新水片分白蠶虫六分寒水石三錢加牛黃

更効 其爲末先以清漿洗淨後將末藥敷上

一 痲出之時曾作泄瀉未經清解以致熱毒逗留於腸胃及麻
收之後變爲休息痢者或赤或白重者後重晝夜無度頻數
欲去終莫能止者此餘熱流滯于大腸也須辨虛實而治之
寔熱者用三黃丸利之 虛者用香連丸解之 後用黃芩
湯 或清熱導滯湯治之總以養血行氣爲主 劉河間曰
養血而下痢自止行氣而後重自除誠治痢之要訣也

三黃丸 治瘰癧後痼瘕

黃芩

酒洗

川連

酒洗

大黃

酒洗

三味

等分

共為細末

米糊作丸如

梧桐子大

每服二三十九

空心白

水送下

香連丸

治一切痼瘕

川連

一兩

外用吳茱萸五兩

浸水同炒去茱萸不用

木香

三兩

共為末

以醋糊為丸

如梧桐子大 米湯送下

清熱瀉滯湯

黃連

黃芩

白芍

炒

以壳

炒

山查

各二錢

厚朴

羌活

黃連

黃芩

白芍

炒

黃連

枳實

各六分

當歸

甘草

牛子

連齋

各五錢

加紅花

三分

地榆

分五

甚者加酒

大黃

錢二

生薑

一片引

此方以芩連喬勞甘草清熱解毒。五貝青朴枳椇澤瀉
行氣。歸花荷榆活。血行滯。去茹生新。誠治痲痢之良方
也。此方去喬勞加三秒莪朮。可治痲熱成痢。

痲退之後。時時咳嗽者。此肺經尚有餘毒。而未能盡解也。宜
用清肺飲。與消毒飲。主之。若嗽太甚。氣喘聲啞。連聲不住。甚
至食穀則噦。飲水則噎。咳嗽出血者。名爲頓嗽。此熱乘於肺。
而然也。宜多服麥冬清肺湯。加速主之。若見胸高如圭。肩
聳而喘。血從口鼻中出。撮鼻插頭。面色青白。或紅而慘暗者。
則毒留已甚。肝肺受傷。不可治矣。然亦有肺氣虛弱。而爲熱
毒。壅肺氣不暢。致咳逆喘急。發嗽連聲。而不已者。但嗽無

通出飲食不噎耳凡如此者須用清肺飲加入參土老亦不可因其咳嗽拘于肺執遂概以清涼之藥治之也

清肺飲合消毒飲治肺熱咳嗽

麥冬 桔梗各錢 知母 桑白皮蜜水炒 地骨皮 天花粉

甘草各錢 牛子 防風 荆芥各錢 加淡竹葉同煎弱者加人參

麥冬清肺飲治肺後咳

知母 川貝母 天冬 麥冬 桔梗 陳皮 杏仁

牛子 馬兜鈴 石羔 桑白皮 用糯米一握同煎

底後咳嗽內熱不清心神慌亂夜卧不安且脾虛或王瘰癧

者宜用

天真膏

生地

四兩去心

玄參

知母

生黃芪

各四兩

白茯苓

桑白皮

炒各四兩

沙參

桑白皮

生以仁

白朮

炒各四兩

丹皮

茯神

紫苑

當歸

橘紅

各二兩

以上諸藥各依分兩取

長流水浸諸藥乃入沙鍋內以桑柴燒火用文武火緩緩

煎熬令藥水成膏再加白蜜入熬然後取起盛淨器中去

其火氣每服三五茶匙以白湯調下

一麻退之後咳嗽聲啞潮熱不退日久延綿而不能愈者此膏

火未除肺金受剋故如是也宜用

清金降火湯

治麻後身熱不退咳嗽聲啞

當歸洗酒白芍炒陳皮甘草川貝母瓜蒌仁白茯苓

玄參炒山枝炒天冬麥冬桑白皮杏仁

石羔炒紫蘇桔梗黃連炒各等分生薑引

一麻退之後或有餘毒而發癰毒肢節疼痛者宜用

薑活散治麻後癰毒

薑活一兩川甲一兩大黃全蠋各五錢一葉金三條去頭足白芷稍銹

甘草節一錢乳香沒藥各一錢或加皂角刺一錢

右共為末好酒調服令取汗為度

一痲退之後餘毒未盡而熱之甚者致口鼻出血須用犀角地

黃湯合解毒湯主之或用四物湯加茵陳木通之類以利小

便使熱氣下瀉于膀胱而自愈也

犀角解毒湯

犀角 生地 赤芍 丹皮 黃芩 黃連 枝子 等分
右方以諸藥共煎另將犀角磨汁調服

加味四物湯

當歸 生地 赤芍 川芎 茵陳 枳子 木通 車前
牛子 蓮荷 知母 活石 甘草

等分煎服此滋陰降火令火下行之義也

一痲退之後餘熱未盡熱乘乎心日夜煩燥狂言妄語人事不
清治此法宜退心經火邪但心與小腸相連欲退心火須

利小便宜用辰砂益元散主之 或用辰砂五苓散別

治之 初起煩躁者則用升麻葛根湯調辰砂益元散主之

辰砂益元散

滑石

飛過

六兩

甘草

兩

辰砂

錢五

木通

錢五

車前

錢五

黃連

另將辰砂乳成灰塵再與諸藥末合研勻 燈心湯下

辰砂五苓散

辰砂

乳另

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

肉桂

炒苓

炒連

共為細末 灯心湯引

升麻葛根湯

升麻

葛根

赤芍

甘草

麥冬

直宜折臂 一麻後餘症

元

麻退之後飲食如常動止如故乃卒然心腹絞痛遍身汗出如雨者此元氣虛弱夫於調理外雖無病真是空虛偶然中惡朝發夕死然痛之不堪或因感風寒而痛者須用升消平胃散方見九散條加木香治之

又有麻後身熱不退飲食不進常常腹痛者此餘毒內留而作痛也須用大黃化毒湯令其下泄則毒退熱除而痛定矣

大黃化毒湯

白芍二錢厚朴一錢陳皮七分甘草三分大黃一錢只壳一錢

一兒麻後身熱痰涎壅盛咳嗽喘急胸高心驚舌啞痰喘請余往視余先用通關散少許吹入鼻中須臾噴嚏流淚吐出痰

涎再用鎮驚九方見丸其心漸平扇然乃不鳴其後用

黃芪 當歸 白芍 前胡 連翹 牛子 桔梗 陳皮

黃芩 花粉 川貝 馬兜鈴 荊芥 知母 甘草

生地 等藥為末與服乃愈

一麻後聲啞者用雪梨水與服能開聲音或用乾梨子煎水與服亦可 或用百合花亦可 或用蘇荷煎水亦可

一麻發痒用酒遍身擦之其痒即止

一麻後須慎風寒水濕蓋疹出之後腠理疏通皮膚必嫩且毒從腠出以達筋骸是以筋骨空虛肌膚不秘若受風寒水濕之患而為終身之患可不慎乎

一痲後須節飲食。蓋疹出之後。內脏空虛。脏腑爲之變。若悞服煎炒。致熱留腸胃。而成痢症。以及心腹疼痛之病。悞服生冷。恐脏虛不能消化。致成痞塊之虞。且食肉太早。則每歲逢出疹之月。多致下痢。膿血。悞食鷄魚。則終身皮膚。染起。猶如鷄皮之狀。但退時行疹。疫又復重出。悞食鹽醋。致令咳嗽。悞食五辛。則主驚熱。種種餘症。不能盡述。必待四十九日。或百目之後。方無禁忌。欲免後患。須宜節之。

孕婦出痲

凡孕婦出痲。必要安胎。胎動則內脏空虛。不能送毒。必致內攻而死。治此之法。須用四物湯。胎加白朮。砂仁。條芩。艾葉。以安

胎清熱爲主胎氣不動則疹亦易出也

如胎氣上逆急服

芍藥根艾葉煎湯磨枳柳調服

一熱毒蒸胎胎多受傷然胎落而母自安蒸疹與痘不同痘要內寔故胎落而母亡疹要內虛故胎去而母存前以安胎爲訓者欲其母子俱存爲仁人之善術也

種痘新書卷之十一終